

Loxonin
loxoprofeno sódico

**Nas dores lombares,
15 minutos fazem
a diferença.**¹⁻⁴



**Rápido alívio da dor logo após 15 minutos
da administração.**¹⁻⁴



**Posologia: 1 comprimido, 3x ao dia; ou em
casos agudos, até 2 comprimidos 1x ao dia.**³

98%

**dos pacientes tratados com Loxonin®
não apresentaram eventos adversos.**^{4#*}

#n= 4024 – Pacientes idosos com dores lombares tratados por até 8 semanas com loxoprofeno sódico em regime aberto. *Idosos com mais de 65 anos, média 72,5 anos




Gráfico adaptado de: Sekiguchi H et al. J Orthop Sci. 2015;20(4):617-23. NRS é a escala numérica de dor de 0 (sem dor) a 10 (pior dor). **Nível de melhora do escore de dor NRS = variação do NRS máximo após 30 minutos e 2 horas da administração única em pacientes com NRS <5. Essa tendência foi mantida para dor severa (NRS ≥5).

Loxonin[®] FLEX 100mg
loxoprofeno sódico

**O único que com
um só adesivo
faz efeito 24h**⁶⁻⁹



Tão eficaz no alívio da dor quanto o loxoprofeno sódico oral.^{6,11}



Melhora a inflamação e a mobilidade.^{6,11}



Baixa incidência de eventos adversos totais.¹¹




1 vez ao dia e com fácil aplicação.^{6,10*}

*Fácil aplicação vs. outras vias de administração.



Absorção sistêmica muito baixa.⁶



Fonte: Fujiki E, et al. Pain. 2019 Jul;160(7):1606-1613. Número total de pacientes no estudo: 242.

Loxonin
loxoprofeno sódico



INDICADO PARA:

Contusão, luxação, distensão, entorse, lombalgia, osteoartrite, artrite reumatoide, bursite, tendinite, pós-cirurgia, infecção das vias aéreas superiores (IVAS) e pós-exodontia.³

Loxonin FLEX 100 mg
loxoprofeno sódico



INDICADO PARA:

dores musculares e traumas.⁶

Referências: 1. Nagaya I et al. Clinical evaluation of CS-600 in the treatment of pain on trauma and postoperative symptoms. Double-blind study in comparison with mefenamic acid. Journal of Clinical Therapeutics & Medicine. 1985;1(1):69-89. 2. Uchida Y et al. Clinical evaluation of CS-600 (loxoprofen sodium) on postexodontic pain - Multi-clinic double-blind study. Oral Therapeutics and Pharmacology. 1984;3(32-48). 3. Bula de Loxonin®. 4. Aoki, T. Effectiveness and Safety of Loxoprofen in Elderly Patients with Lumbar Pain. Drug Invest. 1992. 4(6):477-483. 5. Sekiguchi H et al. Loxoprofen sodium and celecoxib for postoperative pain in patients after spinal surgery: a randomized comparative study. J Orthop Sci. 2015;20(4):617-23. 6. Bula de Loxonin® Flex. 7. Loxoprofen organic amine salt transdermal patch and preparation method thereof. 2013. CN 102940618. Disponível em: <http://patents.google.com/patent/CN102940618A/en>. Acessado em: 08/08/2022. 8. ANVISA- MS. Lista de medicamentos de referência- Lista A. Atualizado em 04/08/2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulador/regulizacao/medicamentos/medicamentos-de-referencia/lista-de-medicamentos-de-referencia>. Acessado em 11/08/2023. 9. Dong L, et al. Efficacy and safety of flurbiprofen cataplasms versus loxoprofen sodium cataplasms in knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Chinese Medical Journal. 2023;10.1097. DOI:10.1097/CM9.0000000000002797. 10. McPherson ML, Cimino NM. Topical NSAID formulations. Pain Med. 2013 Dec;14 Suppl 1:S35-9. 11. Fujiki EN, et al. Efficacy and safety of loxoprofen sodium topical patch for the treatment of pain in patients with minor acute traumatic limb injuries in Brazil: a randomized, double-blind, noninferiority trial. Pain. 2019 Jul;160(7):1606-1613. **LOXONIN® (loxoprofeno sódico) Apresentações:** embalagens com comprimidos de 60 mg. **Uso Adulto. Composição:** cada comprimido contém 60 mg de loxoprofeno sódico anidro (como loxoprofeno sódico di-hidratado) e excipientes qsp 1 comprimido. **Indicações:** anti-inflamatório e analgésico em pós-cirurgia, pós-traumatismo e pós-exodontia; no tratamento de artrite reumatoide, osteoartrite, periartrose escápulo-umeral, processos inflamatórios osteomusculares do pescoço, ombro, braço e lombalgias; como analgésico, anti-inflamatório e antitérmico em processos inflamatórios agudos do TRS (acompanhados ou não de bronquite aguda). **Contra-indicações:** crianças e jovens abaixo de 18 anos de idade; gestantes no último trimestre da gravidez e durante o período de lactação; em pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula; portadores de úlcera péptica, graves distúrbios hematológicos, hepáticos ou renais; disfunções cardíacas graves; asma induzida por AINEs. **Cuidados e advertências:** cautela em pacientes com úlcera associada ao tratamento prolongado com AINEs e que estejam em uso de misoprostol; asma brônquica; disfunção cardíaca; histórico de distúrbios hematológicos ou de disfunção hepática; colite ulcerativa e doença de Crohn. Tratamento prolongado com loxoprofeno sódico: realizar exames laboratoriais periodicamente. Se forem observadas alterações, recomenda-se redução da dose ou interrupção da terapia. Sinais e sintomas de infecção podem ser mascarados durante o uso de loxoprofeno. Administrar concomitantemente com um antibiótico apropriado, caso necessário, quando se tratar de processo inflamatório de origem infecciosa. Pode ocorrer queda acentuada

da temperatura, colapso, extremidades frias, etc. Efeitos como tontura e sonolência têm sido relatados. **Loxonin® é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas.** O uso de Loxonin®, bem como

de outros anti-inflamatórios, pode provocar alteração do controle da pressão arterial em indivíduos hipertensos sob tratamento. **Crianças:** segurança não estabelecida. **Gravidez e lactação:** a segurança do uso de Loxonin® durante a gestação não foi estabelecida, portanto, somente deverá ser administrado a gestantes se os benefícios terapêuticos justificarem os riscos para o feto; bem como durante a lactação. Caso a administração seja considerada necessária, deve-se ter alguns cuidados, como limitar o uso mínimo eficaz e monitorar o líquido amniótico, conforme necessário. **Interações medicamentosas:** loxoprofeno sódico pode intensificar ou diminuir o efeito de alguns medicamentos. **Potencialização do efeito:** anticoagulantes cumarínicos, inibidores do fator Xa, hipoglicemiantes sulfonilureicos, antibacteriano fluoroquinolona, metotrexato, preparações de lítio. **Redução do efeito:** diuréticos benzotiazídicos, anti-hipertensivos (ex.: inibidores da ECA e BRAs). **Interações com álcool:** recomenda-se não ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento, pois pode facilitar o aparecimento de úlceras gástricas ou duodenais. **Interações com alimentos:** não são conhecidas interações entre o loxoprofeno e alimentos. **Reações adversas:** rash cutâneo, sonolência, edema, dor abdominal, desconforto gástrico, anorexia, náusea e vômito, diarreia, aumento das transaminases hepáticas, prurido, úlcera péptica, obstipação, pirose e estomatite. **Posologia:** recomenda-se 1 comprimido, 3 vezes ao dia. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.** MS - 1.0454.0159. Farm. Resp.: Dr. Pedro de Freitas Fiorante - CRF-SP nº 76.376. Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda. MB_06. **Loxonin® Flex (loxoprofeno sódico). N° de Registro MS:** 1.0454.0188. **Indicações:** anti-inflamatório e analgésico local no tratamento da dor, em processos inflamatórios musculoesqueléticos e em condições pós-traumáticas. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MB_01.

LOXONIN® FLEX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

Loxonin
loxoprofeno sódico

Loxonin FLEX 100 mg
loxoprofeno sódico

**Eficácia e segurança do
loxoprofeno sódico**^{1-6,9,11}